

Protokoll: Intimate Radiance Meso Starter Kit

| | Phase 1 (Peeling) | Phase 2 (Mesotherapie) | Ziel |
|---|----------------------|--|---|
| 1 | Lactic Peel 30 % | 2 ml Radiance cocktail 2 ml WCPR 2 ml RCPR | <ul style="list-style-type: none"> Peeling. Aufhellend. Antioxidativ. Hemmt die Melaninbildung, stimuliert die Kollagen- und Elastinbildung. Regenerierend |
| 2 | | 2 ml Radiance cocktail 2 ml WCPR 2 ml RCPR | <ul style="list-style-type: none"> Aufhellend/ lässt die Haut strahlen. Antioxidativ/ hemmt die Melaninbildung /regenerierend |
| 3 | Lactic Peel 30 % | 2 ml Radiance cocktail 2 ml WCPR 2 ml RCPR | <ul style="list-style-type: none"> Peeling. Aufhellend. Antioxidativ. Hemmt die Melaninbildung, stimuliert die Kollagen- und Elastinbildung. Regenerierend |
| 4 | | 2 ml Radiance cocktail 2 ml WCPR 2 ml RCPR | <ul style="list-style-type: none"> Aufhellend/ lässt die Haut strahlen. Antioxidativ/ hemmt die Melaninbildung /regenerierend |
| 5 | | 2 ml Radiance cocktail 2 ml WCPR 2 ml RCPR | <ul style="list-style-type: none"> Aufhellend/ lässt die Haut strahlen. Antioxidativ/ hemmt die Melaninbildung /regenerierend |

Phase 3 (Behandlung zu Hause)

| | |
|------------|--|
| Hygiene | |
| Behandlung | + Ampulle Radiance, Radiance Intimate Cream (morgens und abends) |

TKN 360



Phase 1

Phase 2

Phase 3

Ziele:

Den Hautton aufhellen, mit Feuchtigkeit versorgen und empfindliche Hautpartien mit Hyperpigmentierung verjüngen

Kundenprofil:

- Patienten mit Hyperpigmentierung an Achseln oder in der Bikinizone durch Reibung, trockene Haut oder Haarentfernungen mit Laser.

Anwendungstechniken:

MICRONEEDLING

Tiefe < 0,50 mm

1 Sitzung alle 3 Wochen

ELEKTROPORATION

Elektroporation 20'

1 Mal pro Woche

Anzahl der Sitzungen:

- 6 bis 8 je nach Hautzustand. Eine Sitzung alle 2 Monate wiederholen.

Anmerkungen:

Es wird empfohlen, die Sitzung mit Radiance Peel-Off Mask + Ampulle Radiance abzuschließen. Die Anwendung von Mandelic Peel 30 % wird ebenfalls empfohlen.

Vorsicht bei:

- Patienten mit Blutkrankheiten, Infektionen, Dermatosen oder Allergien und/oder bekannten Empfindlichkeiten auf die bei der Behandlung verwendeten Inhaltsstoffe sollten nicht behandelt werden, dies gilt ebenfalls für Patienten, die sich in einer gerinnungshemmenden Therapie befinden.

Ergebnisse:



Die vorliegende Information wird zu Informationszwecken bereitgestellt und ersetzt keinesfalls medizinische Information. Die vorliegenden Dokumente dürfen ausschließlich zu Informationszwecken zum persönlichen und privaten Gebrauch kopiert und vervielfältigt werden. Jegliche andere Verwendungszwecke der Kopien und Vervielfältigungen sind ausdrücklich untersagt.