

# Protokoll: Mesofiller mit HA

	Phase 1 (Peeling)	Phase 2 (Mesotherapie)	Ziel
1		TKN HA MW 2 % (60 %) NCPR (40 %)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Feuchtigkeitsspendend. Verbessert die interzelluläre Matrix. Füllt Falten auf. Polyrevitalisierend</li> </ul>
2			
3		TKN HA MW 2 % (50 %) TKN HA XS 2 % (50 %)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Feuchtigkeitsspendend. Verbessert die interzelluläre Matrix. Füllt Falten auf. Polyrevitalisierend</li> </ul>
4		TKN HA MW 2 % (60 %) NCPR (40 %)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Feuchtigkeitsspendend. Verbessert die interzelluläre Matrix. Füllt Falten auf</li> </ul>
5		TKN HA MW 2 % (50 %) TKN HA XS 2 % (50 %)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Feuchtigkeitsspendend. Verbessert die interzelluläre Matrix. Füllt Falten auf</li> </ul>
6		TKN HA MW 2 % (60 %) NCPR (40 %)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Feuchtigkeitsspendend. Verbessert die interzelluläre Matrix. Füllt Falten auf. Polyrevitalisierend</li> </ul>

## Phase 3 (Behandlung zu Hause)

<b>Hygiene</b>	
<b>Behandlung</b>	+ Total Recovery Cream / Gel, Anti-ageing + HA ampoule, Linie Cell Architect

## TKN 360



Phase 1

Phase 2

Phase 3

### Ziele:

- Oberflächliche bis mäßige Falten mit Hyaluronsäure hoher Dichte ohne Spritze auffüllen.

### Kundenprofil:

- Alle Personen mit Krähenfüßen, Lippenfalten, Nasolabialfalten, Marionettenfalten, Glabellafalten oder schlaffer Haut

### Anwendungstechniken:

#### MICRONEEDLING

Tiefe < 0,5 mm

1 Sitzung alle 2 Wochen

### Anwendungsvolumen:

**Stirn:** 1 ml NCPR + 1 ml HA MW 2 %

**Glabella:** 0,5 ml NCPR + 0,5 ml HA MW 2 %

**Nasolabial:** 1 ml NCPR + 1 ml HA MW 2 %

**Wangen:** 1 ml NCPR + 1 ml HA MW 2 %

**Hals:** 1 ml HA XS 2 % + 1 ml HA MW 2 %

### Anzahl der Sitzungen:

- 4 bis 6 je nach Hautzustand. Eine Sitzung alle 2 Monate wiederholen

### Anmerkungen:

Es wird empfohlen, die Mesotherapie-Sitzung mit der Antistress mask und Vitamin Burst oder der Anti-ageing Peel-off mask abzuschließen.

### Vorsicht bei:

- Patienten mit Blutkrankheiten, Infektionen, Dermatosen oder Allergien und/oder bekannten Empfindlichkeiten auf die bei der Behandlung verwendeten Inhaltsstoffe sollten nicht behandelt werden, dies gilt ebenfalls für Patienten, die sich in einer gerinnungshemmenden Therapie befinden.

Die vorliegende Information wird zu Informationszwecken bereitgestellt und ersetzt keinesfalls medizinische Information. Die vorliegenden Dokumente dürfen ausschließlich zu Informationszwecken zum persönlichen und privaten Gebrauch kopiert und vervielfältigt werden. Jegliche andere Verwendungszwecke der Kopien und Vervielfältigungen sind ausdrücklich untersagt.